Plan National d'Actions en faveur du Lézard ocellé

Action n°8 : compléments d'inventaires

Femelle adulte en héliothermie matinale sur le toit d'une cazelle. Mai 2014.
Commune de Salvagnac-Cajarc, Aveyron (vallée du Lot, rive gauche). Photo GP.

Guide cartographique pour la recherche de l'espèce en Midi-Pyrénées :

le cas du département de l'Aveyron

Document de travail

Groupe reptiles & amphibiens de Nature Midi-Pyrénées

Rédaction : Gilles Pottier – Nature Midi-Pyrénées
Coordination du réseau PNA Lézard ocellé en Midi-Pyrénées - mai 2014

Préambule

L'Aveyron est indéniablement le département de Midi-Pyrénées où le Lézard ocellé reste à découvrir dans le plus grand nombre de localités.

Le potentiel y est véritablement très important : de nombreuses mailles nouvelles y ont été validées depuis le début de cette action n° 8 « Compléments d'inventaires » et des habitats semblables ou comparables à ceux visités avec succès existent dans de nombreuses mailles non validées.

A n'en pas douter, la cartographie départementale (et, partant, régionale) de l'espèce peut encore fortement progresser, ce qui nous permettra d'obtenir une vision bien plus réaliste de sa répartition et de son statut.

Il est donc apparu utile de produire un guide cartographique spécialement dédié à la recherche du Lézard ocellé dans ce département, à destination de tous les naturalistes intéressés par la recherche du plus grand lézard d'Europe.
Toutes les zones ciblées ici n'hébergent peut-être pas l'espèce mais, au vu des découvertes de ces dernières années, on peut légitimement supposer qu'une bonne partie d'entre elles mérite au moins le détour !



Aveyron (12) – Répartition connue de *T. lepidus* au 28 mai 2014
(Source : BAZNAT)

Rouge : mailles nouvelles validées depuis le début de l'enquête PNA (2013)
Blanc : mailles validées avant l'enquête PNA
Orange : donnée vieillissante / imprécise actualisée durant l'enquête PNA
Gris : donnée vieillissante / imprécise à actualiser

Catalogue cartographique détaillé des zones de présence potentielle du Lézard ocellé en Aveyron, mode d'emploi :

Le « Plan National d'Actions en faveur du Lézard ocellé » prévoit (action n°8) que soient complétées les connaissances relatives à la répartition de l'espèce en France. Il s'agit, notamment, d'identifier à échelle régionale les éventuelles connexions existant entre les différents noyaux de présence connus (inventoriés, pour la plupart, durant la dernière décennie en Midi-Pyrénées !) et les limites réelles desdits noyaux. En effet, des « chapelets » de populations intermédiaires sont à attendre entre plusieurs des différentes zones où la présence de l'espèce est avérée, de même qu'à leur périphérie : des habitats favorables y sont souvent présents, en contexte biogéographique lui-même favorable. L'absence actuelle de données dans ces zones relève donc probablement d'un artifice de sous-prospection.

La mise en lumière de ces continuités permettra d'obtenir une carte de répartition contemporaine réaliste, permettant notamment d'extrapoler la répartition passée en MP (régression des habitats favorables d'après séries historiques de photos aériennes) et les axes autrefois empruntés par ce lézard pour coloniser notre région et les autres régions du Sud-Ouest (S Limousin, bordure SO Auvergne, Aquitaine et Poitou-Charentes) depuis le biome méditerranéen. Elle permettra surtout, si les probables connexions évoquées plus haut sont avérées, de mieux cerner le statut de l'espèce et d'envisager au cas par cas, à échelle départementale mais avec une cohérence régionale, des mesures de conservation réalistes basées sur des données factuelles récentes.

Vous trouverez ici ciblées pratiquement toutes les zones susceptibles d'héberger le Lézard ocellé en Aveyron … là où il n'a pas encore été signalé ou a été trop anciennement signalé. Le plus dur est fait, il ne vous reste qu'à les prospecter !

Ces zones ont été identifiées en superposant plusieurs variables :

-Présence de l'espèce à peu de distance, dans deux directions (hiatus de répartition) ou dans une seule (limite d'aire), dans un contexte d'unité biogéographique (cf. ci-dessous).

-Présence d'habitats favorables à l'espèce (landes ouvertes et pelouses xéro-thermophiles, d'après photos aériennes et/ou repérages de terrain) au sein d'un contexte phytogéographique favorable à l'espèce (d'après les cartes de la végétation du CNRS : séries sub-méditerranéennes du Chêne pubescent & du Chêne vert, notamment).

-Présence de taxons à profil biogéographique comparable, qu'ils soient animaux (notamment vertébrés ectothermes : Coronelle girondine, Lézard catalan, Seps strié …) ou végétaux (Phyllaires, Lavandes, Stéhéline, Bruyère arborée, Chêne vert …).

-Eventuel repérage favorable (plusieurs zones proposées ici ont été visitées en 2013 et 2014).

Ces zones présentent *de visu* des aspects extrêmement variables, en fonction notamment de la nature géologique de la roche mère (sédimentaire, cristalline, métamorphique) et de la végétation associée : par exemple, les sites à Lézard ocellé du Rougier de Camarès ne ressemblent pas du tout aux sites à Lézard ocellé de la vallée du Lot vers Le Fel ! C'est une chose qu'il convient de bien garder à l'esprit, car trop de naturalistes de notre région ont une vision réductrice de l'écologie de cette espèce, qu'ils imaginent ne fréquenter que des milieux de type causse, coteau sec calcaire ou rougier. Ce qui les conduit à négliger certains habitats pourtant bel et bien occupés (escarpements schisteux, murets de pierres sèches en contexte verdoyant de prairie de fauche ou de pâture, zones granitiques, zones bâties …). Le degré d'ouverture du milieu reste par contre toujours plus ou moins élevé (entre 50% et 100% pour faire bref).

L'expérience de terrain acquise en Midi-Pyrénées durant la dernière décennie nous enseigne plusieurs choses importantes :

- La méthode évoquée en page précédente a fait ses preuves et l'espèce a, jusqu'à présent, toujours fini par être découverte dans les zones jugées les plus favorables. Ce constat doit inciter à l'optimisme !

-Cette espèce peut passer inaperçue très longtemps, y compris sur des sites régulièrement fréquentés par des naturalistes. C'est un grand lézard, certes, mais localement très discret, qui nécessite souvent des prospections répétées (5 à 10 visites) avant qu'un premier contact ne soit obtenu. C'est d'autant plus vrai que les populations sont isolées et de faible effectif. Il ne faut donc pas se décourager trop vite.

-Les plus ou moins vieux cimetières bien exposés situés en contexte favorable (voire même situés à une certaine distance des zones favorables, jusqu'à près de 500 m) doivent être systématiquement prospectés (nul besoin d'ouvrir les tombes avec un pied-de-biche : un petit balayage aux jumelles suffit) : l'espèce est **régulièrement** présente dans ce type d'habitat.

-Les témoignages des « locaux » sont en règle générale décevants et ne doivent pas influer sur votre moral : le Lézard ocellé est classiquement assimilé au Lézard vert et vous entendrez régulièrement des « anciens » vous soutenir mordicus avec l'aplomb de l'expert international (« Non, non, non, monsieur, il n'y a jamais eu de ça ici ») que ce lézard n'existe pas … dans un endroit où vous l'observerez 2 heures plus tard (expérience plusieurs fois vécue). Pour autant, il serait balot de ne pas prendre le temps de discuter un peu avec les gens du coin et de leur expliquer ce que vous faites : il arrive souvent que ce lézard fréquente des jardins, potagers etc. et que certaines personnes l'aient bel et bien repéré ! On vous invitera à boire le café pour vous montrer la photo de l'énorme Lézard ocellé ramené l'an dernier par le chat de la maison … Hop, une obs. homologuée (notez le nom / prénom du chat pour le champ « Observateur » de Baznat).

-Le choix des conditions météorologiques et de la période de l'année est primordial : centrez vos recherches sur **la fin du mois d'avril, le mois de mai (en priorité !) et le début du mois de juin**, qui sont de loin les plus propices. Comme pour les autres reptiles, évitez les périodes excessivement sèches et/ou chaudes et privilégiez les premiers beaux jours après une période froide et pluvieuse, ou les journées douces avec ciel voilé. Les pluies de début d'automne permettent souvent d'observer, durant les beaux jours suivants, quelques nouveaux-nés.

-Le Lézard ocellé est une espèce de grande taille (les subadultes et adultes en tout cas) qui occupe des milieux ouverts. Il peut donc s'observer à distance (jusqu'à une centaine de mètres voire un peu plus) et c'est ainsi qu'ont été validées toutes les dernières mailles nouvelles. Effectuez systématiquement un balayage visuel préalable de la zone à prospecter - aux jumelles ou à la longue-vue - avant de vous y engager. Il est fréquent d'observer ainsi un ou plusieurs individus en train de prendre le soleil ou de se promener. Recherchez les « taches vert-jaunâtre » suspectes (c'est ainsi qu'il se signale au regard, de loin) dans l'habitat, **en inspectant visuellement les gîtes potentiels et leurs environs immédiats** : tas de pierres, bâti en pierres sèches (cazelles …), murets, dalles rocheuses fissurées, grosses pierres isolées …

-Les mues ventrales du Lézard ocellé, plutôt épaisses, mettent du temps à se dégrader. Elles perdurent longtemps dans le milieu, notamment à l'entrée des gîtes occupés (fissures, cavités sous de grosses pierres etc.). Elles constituent d'excellents indices de présence (taille et nombre de rangées d'écailles ventrales supérieurs à ceux observés chez le Lézard vert). Les lambeaux de mues dorsaux, plus petits et plus fins, se dégradent plus vite. Ils peuvent cependant permettre une identification fiable dans de nombreux cas (zone à ocelles).

-En cas de fuite suspecte, sans contact visuel permettant l'identification, effectuez un affût immobile durant 10 mn / 20 mn. En général, l'animal réapparaît discrètement (lentement, progressivement et silencieusement, souvent seule la tête émerge) au bout de quelques temps. Autre solution : mémorisez l'endroit, poursuivez votre prospection et repassez y plus tard en effectuant cette fois-ci une observation préalable de la zone à distance (jumelles).

-Prenez des photos pour enrichir le fonds iconographique relatif à cette espèce et permettre une homologation instantanée (de tout : des individus contactés, mais aussi du milieu, des autres reptiles vus …). L'auteur de ces lignes est le premier à jouer le jeu à 100% et à toujours prendre des photos des bêtes contactées.

-Transmettez vos données, sinon tout ça n'aura servi à rien : saisissez les dans Baznat (**ET** Faune Tarn-Aveyron) et tenez informés rapidement de vos découvertes le staff herpéto de NMP.

Mail commun à g.pottier@naturemp.org (coord.), po.cochard@naturemp.org et l.barthe@naturemp.org **ET** aux associations départementales concernées (LPO de l'Aveyron dans le cas présent).

Good luck !

Gilles.

Nord Aveyron : vallées du Lot et de l'Aveyron + vallées affluentes

Maille 4Z – Vallon



Site extrêmement prometteur.



Zone très intéressante (à G du trait : maille 4Y, déjà validée, plusieurs obs. récentes sur Saint Hippolyte).

IGN 2437 O



Près de là ...
(il existe d'autres milieux favorables encore plus en amont vers Le Brézou ...).

IGN 2437 O

Nord Aveyron : vallées du Lot et de l'Aveyron + vallées affluentes

Maille 6U – Capdenac-Gare







Ce coteau à l'E de Saint-Loup est très prometteur, bien qu'isolé.
Voir aussi cimetière de Lunan, en rive D du Lot

IGN 2238 E

Nord Aveyron : vallées du Lot et de l'Aveyron + vallées affluentes

Maille 6Y – Saint Félix de Lunel – Villecomtal



Maille modérément favorable, les milieux propices (de type « rougier » ou « raspe » selon l'endroit) étant rares et de petite taille. Néanmoins, la présence dans les mailles au N, à l'E, au S et à l'O (!) doit inciter à des visites de principe …



S-SO et S-SE de Villecomtal



IGN 2438 O



E de Campuac. Voir aussi (ci-dessous) cette petite section de la vallée du Lot (rive D).

IGN 2438 O



Nord Aveyron : vallées du Lot et de l'Aveyron + vallées affluentes

Maille 6AA – NE Espalion



Divers faciès de type causse/coteau sec jusqu'au N de St Côme d'Olt.

Voir aussi le haut de la maille 7AA « Gabriac ».


12500 Espalion
YALLER
Remonter le temps
2D 3D
Cassagnes
la Coutarie
Souls
Ville
Saulieux
Grge
la Cayrone
Cassagnettes
Valette
Puech Long
Malet
Levers
Artisse
la Crouzette
Grge
Tramons
les Galamanhes
D 636
Puech de Levade
Chemin de Croix
Calv.
Cim.
D 987
Cinqpeyres
Couvent de Malet
le Sol
la Fresquette
Centre Spéc.
Centre Équestre
Chemin de Croix
St-Côme-d'Olt
Lévinhac
Pont
Chât.
Fond du Pont
RN
Camp.
Rauzières
Echelle 1 : 13.542
0
200 m
IGN

IGN 2438 E

Nord Aveyron : vallées du Lot et de l'Aveyron + vallées affluentes

Maille 7U – Villeneuve



Causse de Villeneuve. Causse assez largement cultivé ou embroussaillé. Quelques parcelles paraissant encore très steppiques sur photo aérienne peuvent encore héberger l'espèce.



N –NO de Villeneuve

IGN 2238 E



NE de Villeneuve

IGN 2238 E (extrême S, limite avec 2239 E extrême N)

Nord Aveyron : vallées du Lot et de l'Aveyron + vallées affluentes

Maille 7V – Peyrusse-le-Roc



Peu de milieux favorables, potentiel faible. Quelques « raspes » bien exposées vers Peyrusse ...


Thérondel
la Coste de Counil
la Marsale
Ruines
la Jonquasse
Peyre Signade
Ruisseau
la Prévinquière
la Clédié
le Puech Molinier
le Sirgal
Mas d'Amblard
le Bourdet
Artigues
la Conquie
la Damie
la Cazelle
Tour
Lestrade
le Montet
la Pélélie
Peyrusse-le-Roc
les Justices
Cavaroc
la Côte
Labiouradou
Rnes
le Moulin de Baz
la Combe de Barbe
le Bousquet
Bellevue
Font Bouillencq
les Ortes
la Baume
Laubarède
Borie Milhenque
la Carcinie
Unal
Parriche
D 87
D 287
Echelle 1 : 13.542
0
200 m
IGN

IGN 2238 E

Nord Aveyron : vallées du Lot et de l'Aveyron + vallées affluentes

Maille 7Z – Bozouls



Haute vallée du Dourdou à l'amont de Rodelle. Très favorable, une mention vieillissante. Haute probabilité de contact.



Repérage très positif en 2013 par conditions météo malheureusement mauvaises (une fuite suspecte).

IGN 2438 O

Nord Aveyron : vallées du Lot et de l'Aveyron + vallées affluentes

Maille 7AA – SE Espalion - Gabriac



Zone de St Côme d'Olt en rive D du Lot : cf. maille 6AA.

Maille à potentiel assez faible. Diverses zones de type causse ou coteau sec, éparses et d'assez petite taille, souvent assez élevées. Mais l'exemple du Puech de Gratacap à Saint Santin de Maurs (Cantal) (butte calcaire de 500 m x 500 m, occupée par l'espèce) doit inviter à l'optimisme …



Quelques buttes vers Gabriac et la partie N du causse à l'O de Maymac (partie S du causse, plus étendue et plus propice : voir maille 8AA).

IGN 2438 E et 2439 E.

Nord Aveyron : vallées du Lot et de l'Aveyron + vallées affluentes

Maille 7AB – Saint Geniez d'Olt



Maille à potentiel très faible … sur photos aériennes. Probabilité de présence peu élevée sur cette base là … On verra plus tard …

Nord Aveyron : vallées du Lot et de l'Aveyron + vallées affluentes

Maille 8T – Martiel



Privilégier la zone de l'angle NO de la maille (Le Juge – Bramaloup – Bois de Margues), bien plus riche en parcelles favorables. Présence hautement probable, cette maille ne devrait pas résister longtemps !



Surtout la zone au S de Bramaloup. Attention à bien centrer les recherches sur les zones cerclées : on passe très rapidement sur la maille 8S (où l'espèce est déjà connue) à l'O et très rapidement sur la maille 7T (où l'espèce est également déjà connue) au N (traits noirs).

IGN 2239 O

Nord Aveyron : vallées du Lot et de l'Aveyron + vallées affluentes

Maille 8U – Villefranche de Rouergue



Maille à potentiel modéré. Néanmoins, quelques zones où l'espèce pourrait parfaitement subsister. On a vu pire !



« Raspes » de l'Alzou (surtout) et de l'Aveyron (ci-dessous dans une moindre mesure, car peu étendues dans cette maille). La zone de la chapelle de St Jean d'Aigremont (environs immédiats de La Chapelle) ne doit pas être négligée.



IGN 2239 E



Ensemble de parcelles sub-caussenardes vers La Romiguière …
Notamment en adret du vallon de Malpas. La limite N de la maille 9U est juste en-dessous (trait noir hors fond carto).

Plus au N dans la maille, on trouve ça et là des petites parcelles sub-caussenardes isolées …

IGN 2239 E

Nord Aveyron : vallées du Lot et de l'Aveyron + vallées affluentes

Maille 8V – Compolibat – Prévinquières



Constellation de « raspes » plus ou moins étendues en rive droite de l'Aveyron, surtout sur la section Compolibat - Prévinquières.



Belle raspe, relativement étendue. Plutôt prometteuse …



Bel ensemble de raspes, étendu et donc très intéressant.

A droite du trait noir : relèvent de la maille suivante (8W)

IGN 2339 O

Nord Aveyron : vallées du Lot et de l'Aveyron + vallées affluentes

Maille 8W – Belcastel



Une zone très intéressante à Belcastel (magnifique endroit par ailleurs).

Somptueux et intégralement parcouru par un GR de Pays (en réalité. Pas sur la carte).
Isolé mais sait-on jamais …

Le « puech » de Belcastel. Un excellent degré de pelade et une formidable richesse en gîtes. (prospecté ce jour là par gros cagnard, donc résultat négatif non significatif) Photo GP.
IGN 2339 O et E

Nord Aveyron : vallées du Lot et de l'Aveyron + vallées affluentes

Maille 8Y – Rodez



Potentiel quelque peu limité … La (très) haute vallée du Créneau (haut bassin versant du Dourdou) au N de la maille demande à être visitée.



Adret du vallon d'Onet l'Eglise et surfaces caussenardes connexes. Un cimetière plutôt bien situé, en outre …

IGN 2439 O

Nord Aveyron : vallées du Lot et de l'Aveyron + vallées affluentes

Maille 8AA – Laissac-Bertholène



Trois causses intéressants.



Causse de Bertholène.



Causse à l'O de Maymac. Voir aussi maille 8AB, « causse » au N de Coussergues (angle NE).

IGN 2439 E

Nord Aveyron : vallées du Lot et de l'Aveyron + vallées affluentes

Maille 8AB – Gaillac d'Aveyron - Vimenet



L'altitude se faisant élevée, viser en priorité les adrets bien chauds.



N de Vilmenet et N de Coussergues (à gauche du trait : maille 8AA)



IGN 2539 O



Petit causse à l'O de Lugans.

Voir aussi les divers lambeaux de versants secs dans les vallons affluents

IGN 2539 O – 2439 E

Nord Aveyron : vallées du Lot et de l’Aveyron + vallées affluentes

Maille 9U – Sanvensa



Quelques « raspes » le long de la vallée de l’Aveyron …



Les carrières s'installent de préférence là où la roche mère affleure le plus généreusement, autrement dit : sur les plus beaux habitats à Lézards ocellés, qu'elles détruisent irrémédiablement. Il faut alors chercher des survivants autour, dans les zones d'affleurements satellites … A noter que le cimetière de Morlhon-le-Haut n'est pas trop mal situé …

IGN 2239 E


Orlhonac
le Puech
les Peyres
Puech du Bourguet
Puech de Vialelles
Mouillac
la Castagnal Grande
le Travers
Cantagrel
Cantagrel le Bas
la Vergnole de Sanvensa
le Moulin de Papier
Vialelles
la Cartal
la Pauze
Laurière
la Planque
le Pré Grand
l'Aveyron
la Tuile
la Combe
le Mas de Lafon
le Cluzel
Ravin de Cantagrel
Ravin de l'Iversenc
Ruisseau de Galingorse
D 47
D 648
IGN

IGN 2239 E

Nord Aveyron : vallées du Lot et de l'Aveyron + vallées affluentes

Maille 9Z – Pont de Salars



Quelques jolies zones, mais l'altitude moyenne est élevée. Cibler les adrets abrités.



Zone du causse à Ste Radegonde et divers faciès coteau sec / causse vers St Geniez (tel hagiotoponyme ne peut qu'apporter chance et fortune herpétologiques)



IGN 2439 O

Centre-ouest Aveyron / NE Tarn : vallée du Viaur + vallées affluentes

Maille 10V - Lescure-Jaoul



Vieille mention (années 1980) sur Lescure-Jaoul (François Rancon). Demande à être actualisée. La zone des raspes de Flauzins apparaît la plus favorable. Déjà 3 visites négatives cependant ... Mais il faut quand même insister !



Raspes du Viaur au S de Flauzins. Facilement accessible depuis le hameau.



Raspes du ruisseau de Jaoul.

IGN 2240 E

Centre-ouest Aveyron / NE Tarn : vallée du Viaur + vallées affluentes

Maille 10W – Naucelle



Maille plutôt pauvre en zones favorables. Quelques affleurements à l'E de Castelmary, en espérant que cette zone était autrefois (dans un passé pas trop passé) bien plus ouverte.



Semis de petites surfaces ouvertes à semi-ouvertes. Cerclage non exhaustif, consulter la photo aérienne sur le Géoportail.

IGN 2340 O

Centre-ouest Aveyron / NE Tarn : vallée du Viaur + vallées affluentes

Maille 10X – Camjac



De vraiment beaux habitats rive D dans le quart SO de la maille, dont certains (pas tous !) ont été visités une fois ou deux sans succès (chaleur excessive). Présence assez fortement probable. Insister.



Le site de « La Bartasse », contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, est très ouvert et de surcroît parcouru en zig-zag par un excellent sentier. Il est facilement accessible depuis le hameau de Routaboul. C'est celui qui offre le plus de potentiel, avec le haut de raspe pelé situé immédiatement à l'O. Lézard vert bien présent mais ça ne veut rien dire.

IGN 2340 E


Frons
la Vialette
la Gineste
la Vigne
la Bastide Haute
la Bastide Basse
Frayssinhes
Routaboul
Combecalde
les Gamasses
Coto Drécho
Roumégous
Fonbonne
Lacan
Malbosc
Soulages
le Suc de la Rouquette
la Pierre Plantée
Rébéllès
D 83
les Issarts
Magrinet
Viaur

IGN 2340 E

Centre-ouest Aveyron / NE Tarn : vallée du Viaur + vallées affluentes

Maille 11W – Viaduc du Viaur





Deux sites touristiques favorables : le Viaduc du Viaur et le château de Thuriès (département du Tarn). Concernant ce dernier : déjà visité 4 fois sans succès, alors qu'il est absolument parfait. Par contre, l'adret de la colline au S (« La Forêt) n'a jamais été visité et il est en rive opposée (rive D contre rive G pour Thuriès), donc peut-être un historique de colonisation en jeu. IGN 2340 O

Centre-ouest Aveyron / NE Tarn : vallée du Viaur + vallées affluentes

Maille 11X – Meljac





Divers adrets de la vallée du Céor au N et NO de Meljac

IGN 2340 E

Sud Aveyron : vallées du Tarn + vallées affluentes

Maille 9AC – Séverac le Château S



Plusieurs zones au S de la maille. Privilégier les expositions S assez abritées : altitude élevée.



IGN 2540 E

Une vieille mention à actualiser dans cette zone là.

Attention, on est dans l'extrême angle inférieur droit de la maille concernée et on passe rapidement aux mailles voisines.

Sud Aveyron : vallées du Tarn + vallées affluentes

Maille 10AB – Saint Beauzély – Saint Laurent de Levézou



Diverses zones près de St Beauzély


12100 Millau
Y ALLER
Remonter le temps
2D 3D
les Landes
le Rauzel
D. 30
Bois de Vaysse de
Carr.
Muzette
Scier.
Gend.
les Gardies
St-Beauzély
CT
le Pont
Mairie
Musée
le Devez de Monfouillac
Rnes
Bois Gros de la Fouillouse
Ravin de Vaysse de
Ville
Puech de L
Ravin des Valadous
le Colombier
la Muze
Cim.
le Vergnou
Bergeries
Combe du Causse
Pyl.
la Baume
St. Ébur.
GR 62
Anc. Mine
Puech d'Azinières
Bne
Rvoir
les Tours
Azinières
IGN
Echelle 1 : 13.542
0
200 m

IGN 2540 O

Sud Aveyron : vallées du Tarn + vallées affluentes

Maille 10AC – Verrières

Nombreux milieux favorables un peu partout.



Notamment, entre dizaines d'autres … Se promener sur le Géoportail.

IGN 2540 O et E

Sud Aveyron : vallées du Tarn + vallées affluentes

Maille 11AA – N Ayssènes / NO Viala-du-Tarn



Au N d’Ayssènes, zone présentant un certain potentiel.



Vallon du ruisseau de Coudols : diverses surfaces paraissant propices.
NB : cimetière bien exposé en contexte favorable !

IGN 2441 E

Sud Aveyron : vallées du Tarn + vallées affluentes

Maille 11AE – SE St André de Vézines



Maille partagée entre Aveyron et Gard. La vallée de la Dourbie y présente par endroits des zones favorables au NO et E-SE de St Véran, en Aveyron.



Trait noir : limite E de la maille 11AD, déjà validée.

IGN 2640 O

Sud Aveyron : vallées du Tarn + vallées affluentes

Maille 12AC – La Bastide-Pradines (S Millau)



Tous les adrets à physionomie favorable de la rive D du Cernon, d'une part. D'autre part, très beaux causses « chauds » (végétation thermophile) au-dessus de St Geniez de Bertrand.



« Le Causse » au-dessus de La Bastide, notamment. Mais surtout les zones ci-dessous, vers St Geniez !



IGN 2541 O et E

Sud Aveyron : vallées du Tarn + vallées affluentes

Maille 12AD – La Cavalerie



Maille largement occupée par le haut plateau du Larzac, paraissant trop froid et où l'espèce est manifestement absente. Les angles SO et SE de la maille offrent les plus hautes probabilités de présence (altitude relativement basse, adrets bien exposés).



Diverses zones des environs de Ste Eulalie. On est très proche de la maille 12AC (dont la limite E est matérialisée par le trait noir de G) et de la maille 13AD (dont la limite N est matérialisée par le trait noir du bas).



Zone à l'O du hameau d'Egalières. Plus basse que le Larzac *sensu stricto*, exposée sud. Bon potentiel. Limite S de maille juste en-dessous.

IGN 2541 E

Sud Aveyron : vallées du Tarn + vallées affluentes

Maille 12AE – Nant



Haute vallée de la Dourbie, affluent du Tarn à Millau. Zones très intéressantes vers Nant.



NB : le cimetière est excellemment bien situé.

IGN 2641 O

Sud Aveyron : vallées du Tarn + vallées affluentes

Maille 13Z – Saint Izaire



Divers pseudo-rougiers ou apparentés à l'E de St Izaire, angle NE de la maille et plus au S.



NB : cimetière bien exposé en contexte favorable près de Barralys



Zone intéressante, adret avec faciès de type rougier relativement étendu. Limite de maille à l'E immédiat.

IGN 2441 E.

Sud Aveyron : haute vallée de l'Orb

Maille 13AE – Le Clapier



Le secteur de Le Clapier possède la caractéristique d'être enclavé sur le bassin versant méditerranéen (haute vallée de l'Orb), jusqu'à des altitudes modestes (point bas : 459 m) ce qui en fait **la zone de Midi-Pyrénées où la Couleuvre de Montpellier est le plus susceptible d'exister (blague à part)**.

Tout ce secteur ou presque peut être soupçonné d'héberger le Lézard ocellé, notamment sa bordure SO. Il y existe des données vieillissantes (vers St Xist) méritant d'être actualisées.



Notamment, mais pas que.



Aussi. IGN 2542 E

Sud Aveyron : vallées du Tarn + vallées affluentes

Maille 14AC – Montagnol – Marnhagues-et-Latour



Plusieurs zones favorables.





IGN 2542 O et E



Secteur Montagnol-Laval.

IGN 2542 O et E

Sud Aveyron : vallées du Tarn + vallées affluentes

Maille 15Z – Saint Sever-du-Moustier



Voir notamment le secteur de « Riols », « Couffouleux » etc. en haute vallée du Liamou (O de Murasson). Un peu haut, un côté un peu « montagnard » ...


le soulié
YALLER
REGIONAL
CAUSSES
Couffouleux
la Pancoularie
Sougayrol
Puech de Riols
les Espalies
la Besseirolle
Riols
les Cambous
Fontcuillié
Mandegourc
la Vernière
le Pradal
la Coste
le Roucadel
Calcadieu
les Birades
Nègrefeuille
Lespital
Foulandrin
le Roueau
Crausse
la Tourette
le Vergnas
Raulize
Rabézou
le Serre Grisou
Vabre
Murasson
la Fage
Remonter le temps
2D 3D
Ville
Echelle 1 : 13.542
200 m

IGN 2442 E

Sud Aveyron : vallées du Tarn + vallées affluentes

Maille 15AA – Murasson



Haute vallée du Liamou à l'amont de Murasson, divers adrets paraissant favorables sur photo aérienne.



Voir aussi adret de Vabre en aval immédiat de Murasson (à cheval maille précédente).

IGN 2442 E

Sud Aveyron : vallées du Tarn + vallées affluentes

Maille 15AB – Brusque



Haute vallée du Dourdou. Quelques beaux indices de sub-méditerranéité (Chêne vert, Ciste à feuilles cotonneuses ...). Présence avérée du Lézard catalan.


12360, Brusque
YALLER
Remonter le temps
2D 3D
Ville
Lavergne
Ladoux
Moulergues
Sce captée
Le Code
St-Martin
Carr.
Ruisseau de Moulergues
Ravin des Cadenoux
Ravin des Pradels
Cabriols
la Rega
Ruisseau
Sce
Rvoir
Brox
la Faysse
Brusque
Château fort
Tour
D12
D198
D119
Maurissol
Mais. de retr.
Stèle
Pyl.
Stials
la Tourelle
les Combes
Cramanies
Bge
la Bastidou
Ravin de Stials
Ravin des Roques
la Tanne
Matelat
Limbriac
Sc. épur.
Echelle 1 : 13.542
0
200 m
IGN

IGN 2542 O